

Catalogue

ET

Prix-Courant

DES

PLANTES NOUVELLES ET RARES

CULTIVÉES DANS LES SERRES

de

J. LINDEN

à

LUXEMBOURG.



AUTOMNE 1847.

LUXEMBOURG,

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE M. BEHRENS FILS.

Les prix sont en argent de France. Les frais d'emballage et d'expédition, ainsi que les risques et périls sont pour compte de l'acheteur; tous les soins seront donnés de ma part pour que les plantes atteignent leur destination en bon état. Je prie les personnes qui voudront m'honorer de leur commande, d'indiquer avec soin leur adresse, ainsi que la voie et la marche à suivre pour l'expédition?

Les personnes avec lesquelles je ne suis pas encore en relation, sont priées de désigner une maison chargée d'acquitter le montant de leur commande ou d'y joindre un effet sur une maison de banque d'un pays limitrophe.

Je prie instamment d'affranchir.

Die Preise sind in Franken. Aufträge von unbekannten Bestellern werden nur insofern berücksichtigt, wenn eine sichere Anweisung, für den Betrag der Bestellung, sie begleitet. Verpackungen und Versendungen erhalten alle mögliche Sorgfalt und geschehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, welche gebeten sind den Aufträgen ihre genaue Adresse, so wie die Art und Weise, auf welche sie die Versendungen zu erhalten wünschen, beizufügen.

Alle für Deutschland bestimmte Lieferungen werden durch die Mosel- und Rhein-Dampfschiffahrt möglichst schnell und billig befördert, und sind den oft so nachtheiligen Zoll-Untersuchungen nicht ausgesetzt, da bekanntlich Luxemburg im Deutschen Zoll-Verein begriffen ist.

Bestellungsbriefe erwarte ich portofrei.

The calculations are made in francs and centimes (25 francs 25 centimes to a Pound Sterling). The expenses of package and expedition, the risks and perils lay upon the buyers. On my side the utmost care will be given so that the plants arrive in a good condition.

Expeditions will only be made to persons with whom I have not yet transacted business in as much as those persons design me a house to discharge the amount or by sending a draught upon a banker of London, Antwerp or Paris.

for Address

Letters are requested to be sent franked.

J. Linden.

botanical and horticultural Establishment

Luxemburgh.

BOTA 37233/3

C H O I X

DE

PLANTES NOUVELLES ET RARES

cultivées dans les Serres

DE

J. LINDEN,
à Luxembourg.

AUTOMNE 1847.

N. B. Les plantes précédées d'un astérique ont été découvertes et introduites par nous ou par les voyageurs de l'Établissement; celles précédées de ** sont recommandables par leur beauté, leur récente introduction, et ne sont en vente dans aucun autre Établissement.

SERRE CHAUDE.

	Frs.		Frs.
* <i>Abutilon aurantiacum</i> . (Cette plante est désignée à tort, dans les Catalogues de Belgique, comme étant de serre froide; nous en avons fait la découverte sur le littoral du Venezuela, où la température moyenne s'élève 29° Réaumur.)	3	* <i>Angelonia Funckii</i> .	
* — species à fleurs coccinées	15	** <i>Anona</i> sp. à beau feuillage argenté mat en dessous	40
* — species.		* — <i>lanceolata</i>	30
<i>Achimenes cupreata</i>	10	* — sp. du Cuba.	25
— sp. nova de Sancta Martha	10	* <i>Apeiba tibourbou</i>	25
— sp.		* <i>Aphelandra aurantiaca</i> .	
<i>Aechmea discolor</i>	20	— <i>cristata vera</i>	2
— <i>fulgens</i>		— <i>fulgens</i> .	
<i>Aeschynanthus atro-sanguineus</i>	2	** — <i>ilicifolia</i> .	
— <i>Boschianus</i>	1	* <i>Apocynée grimpante</i> (<i>Strophanthus</i> ?) très-belle	20
— <i>grandiflorus</i>	8	** <i>Aralia capitata</i>	80
— <i>Lobbianus</i>	8	* — <i>cumanensis</i> .	
— <i>pulcher</i>		** — <i>jatrophaefolia</i>	75
— <i>radicans</i>	8	** — <i>multiflora</i> .	
— <i>ramosissimus</i>	1	<i>Ardisia hymenandra</i>	10
— <i>sanguineus</i>		<i>Aristolochia ringens</i>	10
<i>Agati grandiflora</i>		* — sp. de Cuba	10
** <i>Alloplectus speciosus</i> . Splendide espèce à grand feuillage veloute en dessus, pourpre en dessous. Fleurs nombreuses en corymbes; pédoncule, pédicelles et calice d'un pourpre foncé, corolle jaune	50	— sp. nova d'assam.	
— sp.		<i>Barringtonia racemosa</i> (<i>Stravadium</i> .)	15
<i>Alstonia macrophylla</i>	10	* <i>Bauhinia</i> sp. à grandes fleurs blanches	10
* <i>Amaryllis</i> sp. à très-grandes fleurs blanches	5	— sp.	1
** — sp. à fleurs blanches, roses à l'extrémité	25	<i>Begonia coccinea</i>	1
— species		* — <i>cubensis</i>	3
		— <i>fuchsioides</i>	
		— <i>peponifolia</i> .	
		— <i>platanifolia</i> .	
		— <i>velutina</i> .	
		— sp. de Bahia.	
		— diverses espèces indéterminées.	5
		<i>Besleria guyanensis</i>	8
		** — sp. sous ligneuse à fleurs rouges	25
		* <i>Bignonia</i> sp. à fleurs blanches	20
		* — <i>mollissima</i> (fleurs pourpres)	20

	Frs.		Frs.
* <i>Bignonia serrulata</i> .		<i>Dilivaria ilicifolia</i> .	
* — sp.		<i>Dioscorea</i> sp. de Colombie	10
* — sp. de Cuba	20	<i>Dodonæa aspera</i>	10
* <i>Blechnum Brownii</i> (Ruellia)	5	<i>Dracæna fusifolia</i>	20
** <i>Bonplandia trifoliata</i> (<i>Cusparia</i> . <i>Galipea</i>).		* <i>Duchartrea viridiflora</i>	8
* <i>Bowditchia caobano</i>	15	<i>Duranta Baumgardii</i> , à belle panachure	8
<i>Bromelia</i> sp.	20	— <i>Ellisia</i>	2
* — sp. très-belle épiphyte	30	<i>Eranthemum semperflorens</i>	3
— sp.	10	<i>Erythrochiton brasiliense</i>	20
<i>Brownea coccinea</i>	25	<i>Exostemma hirsuta</i> (<i>Oxyanthus</i>).	10
— <i>grandiceps</i>	20	<i>Ficus</i> sp.	5
<i>Caladium pictum</i> (<i>Dieffenbachia</i>)	5	<i>Franciscea hydrangæformis</i>	5
— sp. de Cuba	8	<i>Galactodendron utile</i>	25
<i>Cambessedesia caripensis</i>	10	<i>Galipea cusparia</i> .	
<i>Canna</i> sp.	5	<i>Gardenia malleifera</i> .	
<i>Capparis nodosa</i> .		— <i>Sherbourniæ</i>	3
<i>Carica</i> sp.	3	— <i>Stanleyana</i> .	
** <i>Carolinea</i> sp. nova de Colombie	40	— <i>Withfieldii</i> .	
* <i>Cassia</i> sp.	15	— sp. nova de Sierra Leone.	
* — sp.	10	** <i>Genipa Caruto</i>	40
* <i>Catesbæa Lindeniana</i>	5	* <i>Gesneria elatior</i>	5
<i>Cecropia digitata</i>	5	* — <i>hirsuta</i>	2
— <i>palmata</i>	5	* — <i>longiflora</i>	3
<i>Cephalotus follicularis</i> .		* — <i>multiflora</i>	25
<i>Cereus</i> , diverses espèces de Colombie.		* — <i>rupestris</i> .	
* <i>Cestrum candidum</i>	3	* — <i>Vargasii</i> ?	5
<i>Chætogastra grandiflora</i>	5	— sp.	
** — <i>strigosa</i> (<i>Rhexia inconstans</i>).		<i>Gloxinia Teutcheri</i> .	
Charmante espèce à belles fleurs		<i>Graptophyllum hortense</i> .	
pourpres (Sommet de la Sou-		** <i>Grislea purpurea</i>	25
frière de la Guadeloupe)	25	** — <i>secunda</i>	20
** <i>Charianthus coccineus</i> . Magnifique melas-		<i>Guayacum arboreum</i>	12
tomée à fleurs d'un carmin		<i>Guazuma ulmifolia</i>	5
très-vif	40	<i>Heeria</i> sp. d'Assam.	
<i>Chirita Walkeri</i> .		<i>Heinsia jasminiflora</i> .	
<i>Cinnamomum verum</i> .		<i>Heritiera macrophylla</i>	12
<i>Cleome</i> sp.	10	<i>Hibiscus</i> sp.	
<i>Clerodendrum affine</i>	10	<i>Hoya campanulata</i> .	
— <i>glaucum</i>	8	— <i>lacunosa</i> .	
— <i>sinuatum</i>	10	* <i>Inga saman</i>	5
— <i>volubile</i>	10	* — sp.	10
* <i>Clidemia affinis</i> .		<i>Ixora acuminata</i>	20
* — <i>intermedia</i>	5	— <i>coccinea</i>	2
* — <i>Valenzuela</i>	5	— <i>crocata</i>	3
* <i>Cochlospermum hibiscoides</i>	25	— <i>cuneifolia</i>	2
<i>Coffea arabica</i>	3	— <i>odorata</i>	15
<i>Columnea crassifolia</i>	1	— <i>rosea</i>	20
— <i>pilosa</i> .		<i>Jacaranda tomentosa</i>	6
<i>Combretum macrophyllum</i>	8	<i>Jambosa triternata</i> .	
** <i>Condaminea macropylla</i>	25	<i>Jatropha curcas</i>	5
<i>Cordia Sebestena</i>	10	— <i>multifida</i>	5
— sp. de Maracaybo.		<i>Lafoensia punicifolia</i>	40
** <i>Costus</i> sp. à grand et beau feuillage	25	<i>Lagetta lintearia</i> (arbre à dentelle)	35
<i>Coutarea speciosa</i>	5	<i>Lagerstrœmia reginæ</i> .	
<i>Crinum</i> sp.	5	* <i>Lantana</i> sp. nova	5
* <i>Crotalaria retusa</i>	5	<i>Lasiandra</i> sp.	2
<i>Cryptolepis longiflorus</i> .		<i>Leea lucida</i> .	
<i>Crusea violacea</i>	1	<i>Lemonia rosea</i>	20
<i>Cucurbitacée grimpante</i>	2	— <i>spectabilis</i>	5
** <i>Cusparia febrifuga</i> (<i>Galipea cusparia</i>).		* <i>Luhea caracasana</i>	15
<i>Dasyllirion filirorme</i>	25	<i>Lysionotus longiflorus</i> .	
— <i>serati-folium</i>	10	* <i>Malpighiacea</i> sp. du Venezuela	20
<i>Dieffenbachia picta</i>	5	—	10
— <i>seguina</i> .			

	Frs.
Malpighiaceae sp. de la Havane.	
**Maranta sp. nova à feuilles rayées de rose.	
— à feuilles rayées de blanc ; les deux variétés ont les feuilles d'un rouge foncé en dessous.	
Medinella speciosa. Nouvelle et magnifique Melastomée de Java.	
Melaleuca cajeput.	
Melia occidentalis	2
Melocactus amœnus 10 ctm. haut.	25
— sp. nova de Maracaybo 25 ctm. de haut.	30 à 40
* Miconia chrysoneura	5
* — Lindeniana	5
* — rigida	20
— sp.	20
— sp.	10
— sp.	10
Mimosa adpressa, très-belle espèce de Paragay.	
— sp.	5
Myonima buxifolia	5
Napoleona imperialis	10
Nemathanthus longipes	3
Nepenthes Loddigesii	250
Niphæa albo-lineata	5
Oxyanthus hirsutus	10
* Oxymeris Schlimii	20
* Palicourea? à fleurs bleuâtres	15
** — rigida	
** — sp.	25
— sp.	
Panax fruticosum.	
Pancratium caribæum fort	10
Pandanus inermis	25
* Passiflora biloba	3
— crocea	3
* — hederæ-folia	4
* Pentharaphia cubensis	3
Philodendron crinipes	5
Phyllartrou Bojerianum.	
— comorense.	
Piper plusieurs espèces.	
* Pitcairnia fulgens	20
* — — var : aurantiaca	20
* — sp. à fleurs écarlates	10
* — var : lutea	10
— sp. nova.	
— sp. nova de la Nouvelle-Grenade.	
— sp. nova —	
Poinsettia pulcherrima	1
Porphyrocoma lanceolata	2
Portlandia hexandra	5
Puja Altensteinii les six	10
* — maizæfolia	
Quassia amara	30
Ravenala amazonica.	
Rhaphistemma pulchellum.	
* Rhopala carnea	
— elegans	30 à 80
**Rondeletia discolor (très-belle plante)	25
* Ruellia Brownii	5
— macrophyllum	3

	Frs.
* Rytidophyllum floribundum	3
**Securidacca sp. jolie plante grimpante de l'île de Cuba, à fleurs pourpres.	25
Smilax sp.	
Sophora secundiflora	25
* Solanum à grandes feuilles veloutées, pourpres en dessous	10
Spathelia simplex.	
**Sterculia carthaginensis. Très-bel arbrisseau à grandes feuilles lobées	50
**Steriphoma aurantiaca	50 à 80
Strophanthus Stanleyanus.	
Tecoma schinifolia	2
Theobroma cacao	25
Tillandsia splendens	15 à 20
* — verrucosa	25
— zonata	5 à 10
— 4 espèces de Cuba, chaque à	20
— 6 belles espèces de Colombie, chaque à	20
Tromsdorffia speciosa.	
Wigandia caracasana	5
Xanthochymus ovalifolius.	
Zygophyllum arboreum	12

SERRE FROIDE.

Aralia rufescens.	
* — sp. de la haute Cordillère des Andes.	
Acrophyllum venosum.	
* Alstrœmeria sp.	25
Araucaria Bidwillii.	
Banksia ericifolia	6
— marginata	6
— serrata	8
— sp. nova. Nouvelle Hollande.	
**Befaria æstuans.	
** — albiflora.	
* — coarctata.	
* — glauca.	
** — ledifolia pied-mère fort	200
jeune pied de 6 pouces.	50
** — microphylla.	
* Berberis aurahuacensis	8
— sp. nova de Merida.	
— sp. nova de Pamplona.	
Bouvardia mollis	4
Callitris pyramidalis.	
Cælebogyne ilicifolia	2
Chætagastra strigosa	25
Cheirostemon platanoides.	
Dacrydium Franklinii.	
* Dianella dubia	15
Dryandra speciosa	15
* Drymis glauca.	
* Escalonnia caracasana	30
— sp.	25

	<i>Frs.</i>
<i>Ficus</i> sp. à grand et beau feuillage . . .	10
** <i>Fuchsia</i> <i>apetala</i> Ruiz et Pavon	
** — <i>venusta</i> H. B. K.	
(Ces deux dernières splendides espèces sont en souscription. Les exemplaires seront livrables au mois d'avril prochain, chaque espèce à .	
— <i>sp. nova.</i>	50
<i>Gautiera</i> (<i>Gaultheria</i>) <i>coccinea.</i>	
** — <i>odorata.</i> (Cette espèce, quoique cotée dans quelques Catalogues, n'est pas encore dans le commerce. Les feuilles froissées sont très odorantes	25
** <i>Gaylussaccia</i> <i>buxifolia</i>	30
<i>Grevillea</i> <i>robusta.</i>	5
<i>Hechtia</i> sp. <i>nova</i> de la Nouvelle-Grenade.	
— sp. à fleurs bleuâtres.	
<i>Hedera</i> <i>emarginata.</i>	
<i>Iris</i> <i>sinensis.</i>	5
** <i>Lisianthus</i> <i>coccineus.</i> Magnifique espèce à grandes fleurs d'un carmin très-vif	30
** — <i>frigidus</i>	15
** — <i>glaber?</i>	20
* <i>Lobelia</i> <i>nitida.</i>	3
* — <i>serrata.</i>	5
<i>Macleania</i> <i>coccinea.</i>	15
** <i>Meriania</i> <i>macrantha.</i> Magnifique arbuste à feuilles coriaces luisantes; fleurs très-grandes, pourpres, de trois pouces de diamètre	50
** <i>Phædranassa</i> <i>coccinea.</i>	25 à 40
** <i>Podocarpus</i> <i>taxifolia.</i>	40 à 60
— sp. <i>nova.</i>	
<i>Rhopala</i> <i>montana.</i>	40 à 80
<i>Sarracenia</i> <i>Drummondii.</i>	
— <i>flava.</i>	
— <i>purpurea.</i>	
<i>Siphocampylus</i> <i>microstoma</i> <i>vividis.</i>	
— — <i>rubra.</i>	
* — <i>nitidus</i> (<i>Lobelia</i>)	3
** — <i>scandens.</i>	30
— sp. <i>nova.</i>	
— sp. <i>nova.</i>	
<i>Solanum</i> <i>macrantherum.</i>	
— sp.	5
* <i>Symplocos</i> <i>coccinea.</i>	15
* <i>Tacsonia</i> sp.	5
* sp. <i>nova.</i>	20
<i>Tasmannia</i> <i>aromatica.</i>	4
<i>Taxodium</i> <i>sempervirens.</i>	5
<i>Thuja</i> <i>Doniana.</i>	35
<i>Tropæolum</i> <i>speciosum.</i>	
** — sp. <i>nova.</i>	
** <i>Tupa</i> <i>albiflora.</i>	5
** <i>Vaccinium</i> <i>caracasenum.</i>	25
** <i>Vismia</i> <i>Lindeniana.</i>	45
<i>Vitis</i> <i>argentea.</i>	
— sp. <i>nova.</i>	
** <i>Weinmannia</i> <i>pubescens.</i>	60

FOUGÈRES.

<i>Acrostichum</i> sp. de Cuba	10
— —	5
— —	5
— sp. du Venezuela	8
<i>Adiantum</i> sp. de Cuba	6
<i>Aspidium</i> <i>macrophyllum</i> <i>laciniatum.</i>	15
<i>Asplenium.</i>	
— sp.	
— sp.	2
<i>Blechnum</i> sp. du Venezuela	10
— sp. de Cuba.	4
— sp. —	4
<i>Dicksonia</i> <i>adiantoides.</i>	1
<i>Diplazium</i> <i>giganteum.</i>	30
<i>Gymnogramma</i> <i>calomelanos.</i>	2
— sp.	10
<i>Polypodium</i> <i>aureum.</i>	1
— sp.	10
— sp.	2
<i>Pteris</i> sp.	25
— sp.	4

FOUGÈRES ARBORESCENTES.

* <i>Alsophylla</i> <i>villosa</i> (frondes d'un mètre). .	150
** — ? sp.	200
<i>Blechnum</i> <i>brasiliense.</i> très-fort	80
<i>Cyathea</i> <i>speciosa.</i>	
<i>Dicksonia</i> sp.	
* <i>Hemitelia</i> <i>integrifolia</i> (hauteur du tronc 0 ^m 65 c.; longueur des frondes 1 ^m 25 c.)	300
— — (hauteur du tronc 0 ^m 35 c.); longueur des frondes 0 ^m 30 c.)	150
** — <i>obtusa</i> (hauteur du tronc 0 ^m 90 c.; frondes 1 ^m 50 c.)	400
— — (hauteur du tronc 0 ^m 40 c.; frondes 0 ^m 60 c. à 0 ^m 80 c.)	150
— — hauteur du tronc 0 ^m 25 c. à 0 ^m 30 c.	100
** — <i>speciosa</i> (hauteur du tronc 0 ^m 45 c.)	250
— — (haut. du tronc 0 ^m 30 c.)	100
— — (haut. du tronc 0 ^m 20 c.)	60

ORCHIDÉES.

	Frs.		Frs.
Acanthophippium bicolor	10 à 20	Centrosia corymbosa.	
— sylhetense	8	— sp. nova.	
* Acineta Barkeri	10	**Chondrorhyncha rosea.	
* — Humboldtii	15 à 30	Chysis aurea.	
— longiscapa	15 à 25	— bractescens	50
** — montalbensis	30 à 40	Cirrhaea fusco-lutea	3 à 6
** — sp. nova de Socorro. Pseudo bulbes		— Loddigesii	5 à 10
gigantesques, hampe de trois pieds		— picta	10
de longueur	60 à 80	— squalens	5
Acropera Loddigesii	3 à 6	* Cleistes rosea.	
— luteola	10	**Cœlia cubensis	25 à 40
Aerides odoratum	40	Cœlogyne fimbriata.	5
— major	50	— Wallichii.	
Aganisia pulchella.		— sp.	
Anæctochilus argenteus	10	**Comparettia falcata	60 à 100
— setaceus.		Coryanthes macrantha	50 à 60
* Anguloa Clowesii	35 à 60	— maculata	40 à 60
** — Ruckeri	80 à 120	— speciosa.	
* — uniflora	60 à 80	Cynoches chlorochilum	15 à 30
Aspasia guyanensis.		— Loddigesii	35 à 45
Barkeria melanocaulon	50	— maculata	50 à 60
— spectabilis.		— ventricosum	30 à 45
Batemannia Colleyi	15	* Cyrtochilum floribundum (Odontoglos-	
Bifrenaria atropurpurea	5	sum constrictum	8 à 12
aurantiaca	15	— stellatum.	
aureo-fulva	10	* Cyrtopera scabrelinguis	20 à 30
**Bletia campanulata. Nouvelle et splendide		* Cyrtopodium bracteatum	15 à 25
espèce à très-fortes bulbes, fleurs		— punctatum	20 à 30
grandes, nombreuses d'un pourpre		** — sp. nova de Cuba à fleurs	
éclatant	40 à 100	lilas ?	30 à 40
— Starkii	20 à 30	Dendrobium calceolaria.	10 à 20
— sp. de Colombie	10	— chrysanthum	20 à 30
— sp. du Mexique	10	— densiflorum.	
Bolbophyllum bracteolatum.		— intermedium.	
Brassavola cordata	10	— Jenkinsii	15 à 25
— glauca.		— moniliforme	15 à 25
— venosa	6 à 30	— moschatum.	
** — sp. nova de Socorro	25 à 30	— nobile	8 à 20
**Brassia glumacea.		— Pierardii	5 à 15
— Lanceana.		— pulchellum.	
Broughtonia sanguinea.		— Ruckerii.	
**Burlingtonia granadensis	40 à 100	— Wallichianum.	30
Calanthe veratrifolia	10	Epidendrum aurantiacum	15 à 25
— versicolor.		— bicornutum	35 à 60
Camaridium ochroleucum	6	* — blepharistis.	40 à 50
Camarotis purpurea	20	— Boothianum.	
Caravata Aubletii.		— cinnabarinum	15
Catasetum maculatum	20	— cochleatum	10
* — naso	30	— erubescens	75
** — serratum	40	** — fallax.	
** — sp. nova de Socorro à hampe de		** — — var. à fleurs jaunes.	
2 pieds de hauteur	40 à 60	— floribundum	8
** — sp. nova	25 à 30	— fragrans	5 à 10
Cattleya crispa.		— frigidum. Cette plante re-	
— granulosa	25 à 40	marquable croît à peu de	
— guttata	50	distance des neiges éter-	
— Mossiæ	12 à 25	nelles. Les fleurs sont en	
** — albiflora	40 à 60	forme de clochettes, roses	
— Skinneri.		et enduites, de même que	

	Frs.		Frs.
		la tige et les feuilles d'un,	
		verniss luisant	80 à 100
		Lindenii	30 à 40
Epidendrum		macrochilum	8 à 15
—		— albo-roseum	15 à 20
—		— purpureum splendens	30 à 40
**		— nidus	30
*		— oxypetalum	10 à 20
—		Parkinsonianum	38
—		phœniceum (verum)	25 à 40
—		pterocarpum	5
—		radiatum	10
**		— refractum	
—		selligerum	15 à 25
—		Skinneri	
—		stenopetalum	
*		tigrinum	30 à 50
**		— var. à fleurs blanches	30 à 50
—		virgatum	10 à 20
—		viscidum	8
—		vitellinum	
—		sp. n° 1 Colombie	25
—		sp. 2 —	10
—		sp. 3 —	
—		sp. 4 —	35
—		sp. 5 —	
—		sp. 6 —	
—		sp. 7 —	
—		sp. 8 Cuba	25
—		sp. 8 —	
—		sp. 10 Mexique	20
—		sp. 11 —	
—		sp. 12 —	
—		sp. 13 —	
Eria profusa.			
**		Evelyna bractescens	
**		— columnaris	100 à 150
**		— lupulina	
**		Fernandezia longifolia	20 à 30
		Galeandra Baueri	10
		Gongora atro purpurea	16
—		— maculata citrina	20
—		— sanguinea	
*		Govenia fasciata	15 à 20
—		— superba	10 à 20
		Grobya Amherstii	15
		Houlletia stapeliæflora	
		Jonopsis pulchella	
—		— tenera	30
		Lacæna bicolor	
		Lælia anceps	
—		— flava	25
—		— furfuracea	15
—		— grandiflora	20
*		— Lindenii, très-belle espèce de l'île de Cuba à grandes fleurs rose pâle	60 à 80
—		— superbiens	fort 50
**		— sp. nova de la province de Colima (Mexique)	60 à 80
		Lycaste aromatica	5 à 10
—		— Deppii	3 à 10
*		— fulvescens	35 à 50
*		Lycaste gigantea	15 à 30
—		— macrophylla	15
—		— Skinneri	30 à 40
—		— tyrianthina	5 à 10
**		Masdevallia candida	
**		— coccinea	
**		— polyantha	40 à 60
**		— Schlimii	
**		Maxillaria albata	35 à 50
—		— aromatica (Lycaste)	5 à 10
—		— Deppii (Lycaste)	3 à 10
*		— grandiflora	40 à 60
**		— luteo-alba	40 à 50
**		— longissima	
**		— melina	
**		— nigrescens	35 à 50
**		— sp.	
—		— sp.	
		Miltonia epidendroides	
—		— spectabilis	35 à 60
		Mormodes aromatica	10
*		— Cartoni	25
**		— sp. du Venezuela	40
		Neottia orchioïdes	
—		— sp.	15
		Notylia incurva	5 à 10
**		Odontoglossum angustatum	
—		— Cervantesii	25
—		— citrosmum	20 à 40
*		— constrictum	8 à 10
—		— grande	20 à 40
**		— Hallii	
—		— hastatum	10 à 25
**		— hastilabium. Magnifique espèce à grandes fleurs blanches rayées de rose	100 à 150
—		— Inseayi	25
—		— Lindlyi	20
—		— membranaceum	25
**		— nebulosum	
**		— odoratum	40 à 50
—		— pulchellum	
—		— Rossii	
—		— sp. nova n° 1 Colombie	30 à 60
—		— sp. nova 2 —	25 à 40
—		— sp. nova 3 —	60
—		— sp. nova 4 —	
—		— sp. nova 5 Mexique	
		Oncidium altissimum	10
—		— ampliatus	10 à 15
—		— majus	
—		— Cavendishianum	20 à 35
—		— crispum	
**		— falcipetalum	60 à 100
—		— graminifolium	25
—		— juncifolium (Cebolleta)	5 à 15
—		— Lanceanum	20 à 30
—		— Lemonianum	
—		— luridum roseum	15 à 25
—		— macropterum	10
*		— maizæfolium	
—		— papilio	20 à 25
—		— majus	30 à 40

	Frs.
Oncidium sanguineum (Huntianum)	15 à 25
— sphacelatum	10 à 20
— Suttonii	15
** — variegatum. Charmante espèce ayant le port de l'O. iridifo- lium et les fleurs blanches lavées de rose. Originaire de Haïti et St.-Yago de Cuba	30 à 40
** — sp. du Venezuela	25
** — sp. —	30 à 60
** — sp. —	
** — sp. Nouvelle-Grenade	20 à 30
** — sp. —	25 à 35
** — sp. —	
— sp. de Cuba	25 à 40
Ornithidium album	
— coccineum	10
** — sanguinolentum	20 à 30
Ornithocephalus ciliatus	15
Peristeria Barkeri (Acineta)	10
— elata	
** — gigas	60 à 100
— Humboldtii (Acineta)	15 à 30
— longiscapa (Acineta)	15 à 25
** — montalbensis (Acineta)	30 à 40
** — sp. nova de Colombie	50 à 60
* Phajus albus	20
— bicolor	
— Wallichii	10 à 20
Physurus pictus (Anæctochilus)	10
* Pilumna fragrans	25
**Pleurothallis aureo	
** — Lindenii	20 à 30
** — rosea-punctata	
— ruberrima	
sp.	
**Ponthieva maculata	30 à 40
Renanthera coccinea	
**Restrepia punctulata	40 à 50
** — vittata	25 à 30
Rodriguezia secunda	10 à 20
** — stenochila	25 à 40
Sarcanthus rostratus	
**Scaphyglottis ruberrima	
* Schomburgkia rosea	40 à 80
— tibicinis	
* — undulata	20 à 40
— sp. de Cuba	
Serapias caravata	
**Sobralia dichotoma. Cette espèce sur- passe en magnificence toutes ses congénères; chaque tige porte de 15 à 20 fleurs de la plus grande beauté	150 à 200
— liliastrium	60 à 80
* — macrantha	
** — purpurea. Toute nouvelle espèce de Colombie à grandes fleurs pourpres	80 à 100
** — violacea. Nouvelle espèce de la haute Cordillère, à fleur d'un violet pâle	60 à 100
** — — var: albiflora	60 à 100

	Frs.
Stanhopea aurantia	20 à 25
* — Devoniensis	
— eburnea	4 à 10
— quadricornis	
* — saccata	15 à 20
* — tigrina	
— Wardii	10 à 25
sp. nova des côtes de l'Océan pacifique	25 à 50
sp. nova de Socorro	20 à 35
Stelis crassifolia	10
— plusieurs espèces	chaque à 6
**Telipogon angustifolius	
* Trichopilia tortilis	20
**Uropedium Lindenii. (Nouveau genre de la tribu des Cypripediées) terrestre à fleurs de 12 à 15 pouces de longueur	200 à 250
Vanda Roxburghii	
* Warrea bidentata	50 à 75
* — cyanea	10 à 20
* — Lindeniana	50 à 75
— sp. nova	40
Xylobium sp. de Colombie	15
**Zygopetalum gramineum	

PALMIERS, CYCADÉES ET CYCLANTHÉRÉES.

Acrocomia aculeata	50 à 100
— cubensis	80 à 150
Areca manicot	100 à 300
— oleracea	50 à 100
— rubra	
— sp. nova	100
Astrocaryum sp. de Colombie	50 à 100
— sp. de Cuba	100 à 200
Attalea amygdalina (Palma almendron	
— manaca	100 à 150
— oleracea	50 à 80
* — purpurea	100 à 150
— sp. du Mexique	50
— sp. de la Nouvelle-Grenade	50
— sp. du Venezuela	50
* Bactris caracasana	30 à 75
** — catell	40 à 80
— setosa (flavisquina)	25 à 50
* — macanilla	30 à 75
— minor	60
— sp. de Colombie	
**Carludovica furfurosa	20 à 40
** — integrifolia	25 à 50
— montana	
— palmifolia	10 à 30
Caryota sobolifera	40
Ceratozamia gigas. (Nouvelle espèce de la Nouvelle-Hollande, dont les frondes mesurent 6 à 7 pieds de longueur)	150

	Frs.		Frs.
* Ceratozamia mexicana	25	* Oenocarpus-Boliviana	50
* Ceroxylon andicola	100	— Caracasana	50 à 100
** — de graine	15	* — lutescens.	
* Charmædorea aurantiaca.		Oreodoxa regia	3 à 80
— elatior.		Phoenix farinifera.	
— elegans	30 à 60	Phytelephas macrocarpa	80
— gracilis	25 à 80	Rhapis flabelliformis	10
* — Lindeniana	25 à 100	Sabal havenensis	50
— scandens	15	— glauca	50
— sp.		Thrynax argentea.	
Cocos aculeata (Acroconia)	50 à 100	— paviflora	25 à 60
— nucifera	50	— stellata.	
* — oleracea (Attalea)	50	** — tunicata	100 à 400
** Copernicia Carey (Cuba)	100 à 200	Wallichia caryotoides	80
** — Guanacoa (Cuba)	50 à 100	* Zamia furfuracea	très-fort 150 à 200
Corypha Gebanga.		— — — — —	moyen 80 à 100
Cycas revoluta.		* — linearifolia	très-fort 150 à 200
Cyclanthus bipartitus	15 à 40	— — — — —	moyen 80 à 100
Desmoncus auericanus? . de graine	15	* — muricata	6
Diplothemium maritimum.		** — montana. Magnifique espèce,	
Dion aculeatum	10	— — — — —	très-fort 200 à 300
* — edule	100	— — — — —	moyen 100 à 150
Harina caryotoides	75	— spiralis	10
Jubæa spectabilis	6	** — Verbrugghiaua	très-fort 150 à 200
** Kunthia montana	100 à 200	— — — — —	moyen 80 à 100
** — nana	80 à 150	— sp. nova	80 à 150

Araucaria brasiliensis	les six	18
— iubricata	les six	18
— — — — —	la douzaine	30



COLLECTIONS DE PLANTES SÈCHES.



Herbiers du Mexique.

Plantes recueillies par J. LINDEN, depuis 1837 jusqu'à fin de 1840, dans les Etats de *Vera-Cruz, Puebla, Mexico, Yucatan, Tabasco et Chiapas* (y compris une collection complète des plantes qui croissent sur le pic d'*Orizaba* jusqu'aux neiges perpétuelles).

Plusieurs Collections de 500 à 700 espèces sont en vente à fr. 40 la centurie d'espèces.

Venezuela et Nouvelle Grenade.

Plantes recueillies par J. LINDEN, pendant les années 1841 à 1844, dans les provinces de *Caracas, Carabobo, Barquisimeto, Truxillo, Maracaybo et Merida*, dans le *Venezuela* et dans les provinces de *Pamplona, Socorro, Veles, Tunja, Bogota, Mariquita, Cauca, Ocaña, Rio-Hacha et Santa-Marta*, dans la Nouvelle-Grenade.

(Cette Collection est très-intéressante, composée de beaux exemplaires et d'une série non interrompue de plantes, collectées depuis le littoral de la mer des *Antilles* jusqu'aux régions des neiges éternelles, à 14,400 pieds de hauteur.

Plusieurs Collections de 1000 à 1400 espèces sont disponibles, la centurie d'espèces à fr. 45.

id. id. au-dessous de 1000 espèces à fr. 40.

Voyage de N. FUNCK dans les provinces de *Caracas, Carabobo, Cumana au Venezuela*, ainsi que dans celles de *Santa-Marta et Carthagène* dans la Nouvelle-Grenade.

Six Collections de 400 à 700 espèces sont en vente, la centurie à fr. 45.

Jamaïque et île de Cuba.

Plantes recueillies par J. LINDEN en 1837 et 1844, dans les montagnes bleues de la Jamaïque et dans les provinces de la *Havane et de St.-Yago de Cuba*.

Quelques Collections de 300 à 400 espèces, la centurie à fr. 45.

Fougères et Lycopodes.

Des Collections spéciales de ces intéressantes familles de plantes sont disponibles.

Elles se vendent séparément par Collection de 200 à 400 espèces, la centurie à fr. 50.




EN SOUSCRIPTION.

Plantes sèches de la *Guadeloupe et de la Colombie*, collectées par Messieurs FUNCK et SCHLIM, actuellement dans la Nouvelle-Grenade.

1,400 espèces sont à distribuer au prix de fr. 45 la centurie d'espèces.

Dix Collections plus ou moins complètes sont disponibles.

N. B. Toutes les Collections d'Herbiers sont livrables dans un parfait état de conservation, étiquetées et en partie déterminées.



COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer